

令和3年産

J A おおいた東部事業部 特裁米（つや姫）栽培ごよみ

早期

◎早植えと早期落水は、米の品質低下につながります！

特裁米（つや姫）を栽培する場合は、この栽培ごよみの肥料・農薬の使用をお願いします。

| 項目 | 3月以前 | | 3月 | | | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | |
|--------------------------|---|--|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|---------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|-----------------|----|----|
| | 上~下旬 | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 水管理 (4月中旬植付基準) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生育ステージ | 土づくり | | 播種 | | | 4/20 田植え | | | | | | 6/27 穂肥 | | | 7/15 出穂 | | | 8/20 刈取 | | | 籾が8割程度黄化 → 刈取適期 | | |
| 病虫害の防除 | 病虫害名 | 枯ばい病、細かもち病、菌苗病、芯枯線虫病、ウハイ病、籾ンマカキ類、類菌病、除草、紋枯病、カウメムカシ類、(カウメムカシ類のみ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 防除時期 | 播種時~移植当日、移植後~30日、分けつ終止期~出穂期まで、穂揃期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 農薬名 | 塩水選、又は温湯消毒、タフプロック、スミチオン乳剤、防人箱粒剤、ボリデール・ジャンドプロ、モンカッタフロアブル、スタークルD10粉剤、スタークルD10粉剤、スタークルD10粉剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (成分数) | 0, 0, 1, 3, 2, 1, 1, (1), この層での薬剤総使用点数:9点 (スタークル2回防除時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10a当り散布量 | 育苗箱当り、10g当り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 品種名 | | 基 肥 | | 施肥量 | |
|----|-----|-------|-----------------------|----------|------|----------|
| | つや姫 | ミネラルG | 200kg | 特裁用元肥052 | 30kg | 特裁用追肥047 |
| | | | 一発肥料 有機エムコートまんてん(80日) | 50kg | | 施肥不要 |

| ミネラルG施用 | 種子消毒 | 基肥施用 | 箱苗施用 | 田植 | 除草剤散布 | 穂肥施用 | 出穂施用 | 病虫害防除 散布日 | 刈取 |
|---------|------|------|------|-----------|-------|------|------|-----------|-----------|
| 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 ~ 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 ~ 月 日 |

特裁米（つや姫）の必須条件

◎特裁米栽培基準

水田管理情報は、東部振興局または事業部農畜産課